

Die Produktwirkstoffe

Borsäure

2,5 % wasserlösliches Bor (125 g wasserlösliches Bor/ha)

33 % CaO (23 % Ca aus Calciumformiat)

Als staubfreies und sehr gut wasserlösliches Mikrogranulat.

Folanx® B basiert auf der erfolgreichen Formulierung von **Folanx® Ca29** und wird schnell über das Blatt und die Blüte aufgenommen. Auf Grund der guten Mischbarkeit kann der Einsatz zusammen mit Pflanzenschutzmitteln erfolgen. **Folanx® B** ist stickstofffrei.

Fördert das Pollenschlauchwachstum und verbessert die Fruchtbarkeit der Blüten. Kann Frostschäden der Blüte vorbeugen.

Anwendungsempfehlung

Apfel:

Zur Förderung des Pollenschlauchwachstums und zur Verbesserung der Blütenfruchtbarkeit. Gegen Bormangelerscheinungen 2 bis 4 Behandlungen mit jeweils 2,5 kg je ha und je Meter Kronenhöhe vom Rote-Knospe-Stadium der Blüte bis zur Vollblüte und 2 Behandlungen mit jeweils 2,5 kg je ha und je Meter Kronenhöhe nach der Ernte.

Steinobst:

Für einen besseren Fruchtansatz und stabilere Früchte 2 bis 6 Behandlungen mit jeweils 5,0 kg/ha vor der Blüte bis zur Ernte.

Wein:

Für eine bessere Fruchtbarkeit und stabilere Früchte und bei akutem Bormangel 2 bis 6 Behandlungen mit jeweils 2,5 kg/ha vor der Blüte bis zum Traubenschluss.

Birne:

Gegen Bormangelerscheinungen 2 bis 4 Behandlungen mit jeweils 5,0 kg/ha ab Sommer bis zur Ernte.

Kopf- und Kohlgemüse:

Gegen Herz- und Blattrandnekrosen 3 bis 4 Behandlungen mit jeweils 5,0 kg/ha ab Beginn der Kopfentwicklung.



Hinweise

Rückenspritze:

1 %ig

Mischbarkeit:

Folanx® B ist mit den gängigen Pflanzenschutzmitteln mischbar. Da jedoch nicht alle in der Praxis auftretenden Zufälle voraussehbar sind, ist in jedem Fall ein Mischversuch mit kleinen Mengen der für die Spritzung vorgesehenen Produkte zweckmäßig. Die Wasseraufwandmengen sollten 500 L/ha nicht unterschreiten. Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden (Ansprüche der Kultur und Bodenanalyse beachten). Empfohlene Aufwandmengen nicht überschreiten. Nur trockene Blätter behandeln. Die zulässige Höchstkonzentration von 20,0 kg/ha **Folanx® B** sollte nicht überschritten werden, um phytotoxische Reaktionen der Pflanzenteile zu vermeiden.

Einwirkungsdauer:

mind. 2 Stunden vor Beregnung oder Niederschlag.

Verpackungsgrößen:

15 kg Versandkarton (3 Aluminiumtüten à 5 kg)

Lagerung:

Nicht unter 0 °C

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise – insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen – und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf

unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

LANXESS Distribution GmbH
Chempark Leverkusen
Kaiser-Wilhelm-Allee 40
51369 Leverkusen
Deutschland
www.folanx.de
www.lanxess-distribution.com

LANXESS
LANXESS Distribution GmbH